

OxyNorm® 10 mg/ml, solution buvable

Chlorhydrate d'oxycodone

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable ?
3. Comment prendre *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable, et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament est un analgésique opioïde (destiné à soulager la douleur).

OxyNorm®, solution buvable, est utilisé pour le traitement des douleurs intenses qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques forts, notamment les douleurs cancéreuses.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable ?

Ne prenez jamais *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable, dans les cas suivants :

- chez l'enfant de moins de 18 ans ;
- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active, le chlorhydrate d'oxycodone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une maladie pulmonaire sévère, associée à un rétrécissement des voies respiratoires (bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO) ;
- si vous souffrez d'un asthme bronchique sévère ;
- si votre respiration n'est pas en mesure d'apporter suffisamment d'oxygène dans le sang et d'éliminer le gaz carbonique par votre corps (dépression respiratoire sévère avec hypoxie) ;



- si le taux de gaz carbonique dans votre sang est trop élevé ;
- si vous souffrez de dysfonctionnements intestinaux avec occlusion intestinale (iléus paralytique) ;
- si vous souffrez de problèmes cardiaques à la suite d'une insuffisance pulmonaire chronique (cœur pulmonaire) ;
- si vous souffrez d'une maladie grave du foie ;
- si vous allaitez ;
- si vous êtes traité(e) par des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine, de la pentazocine, (substances ayant des propriétés comparables à celles de l'oxycodone) ainsi que par des médicaments contenant de la naltrexone et du nalméfène.

Faites attention avec *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre *OxyNorm*® solution buvable.

Mises en garde spéciales :

Votre médecin accompagnera ce traitement d'une surveillance adaptée à son utilisation.

En cas de traitement prolongé et répété par l'oxycodone, il est impératif de ne pas arrêter brutalement le traitement, car cela expose à la survenue d'un syndrome de sevrage (voir rubrique 4 : Quels sont les effets indésirables éventuels ?). L'augmentation progressive des doses, lorsqu'elle est nécessaire et même si elles sont élevées, n'expose pas le plus souvent au risque d'apparition d'une accoutumance.

Ce médicament, s'il est mal utilisé, peut entraîner une dépendance physique et psychique.

Une toxicomanie ou un alcoolisme, antérieurs ou actuels, n'empêchent pas la prescription d'oxycodone si celle-ci est indispensable.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110, jaune orangé S) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse.

Précautions d'emploi :

Ce médicament doit être utilisé AVEC PRECAUTION :

- chez les personnes âgées ou fragilisées ;
- si vous avez un myxoedème (troubles thyroïdiens,



accompagnés d'une peau sèche, froide et d'un gonflement au niveau du visage et des membres) ;

- si votre glande thyroïde ne produit pas assez d'hormones (insuffisance thyroïdienne) ;
- si vous avez un traumatisme crânien ;
- si vous avez une diminution du volume total de sang (hypovolémie) ;
- si vous souffrez d'insuffisance respiratoire (diminution de la capacité à respirer) ;
- si vous souffrez d'une maladie chronique du foie (insuffisance hépatique) ;
- si vous souffrez d'une inflammation du pancréas (pancréatite) ;
- si vous souffrez d'insuffisance rénale ;
- si la taille de votre prostate est anormalement augmentée ou si vous avez des difficultés à uriner ;
- si vous souffrez de constipation (signalez toute constipation à votre médecin pour qu'il vous donne un traitement adapté) ;
- si vous souffrez d'une insuffisance des glandes surrénales (maladie d'Addison) ;
- si votre tension est trop basse (hypotension) ;
- si vous souffrez d'alcoolisme ou de delirium tremens ;
- si vous souffrez de troubles mentaux induits par une substance ou par une infection (psychose toxique) ;
- si vous ressentez une douleur anormalement intense (hyperalgésie).

Si vous devez subir une opération chirurgicale, informez votre médecin que vous prenez ce médicament.

Autres médicaments et *OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable :

Ce médicament ne doit pas être associé à la nalbuphine, la buprénorphine ou la pentazocine, ainsi qu'à la naltrexone et au nalméfène.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, et notamment des médicaments agissant sur le système nerveux central et pouvant avoir un effet sédatif :

- médicaments utilisés pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques, sédatifs) ;
- médicaments utilisés pour traiter l'anxiété (tranquillisants) ;

- médicaments utilisés pour traiter les troubles psychiques (neuroleptiques) ;
- médicaments utilisés pour traiter la dépression (antidépresseurs) ;
- médicaments utilisés pour traiter les allergies (antihistaminiques) ;
- autres médicaments utilisés pour traiter les douleurs modérées à intenses (analgésiques opioïdes) ;
- médicaments antitussifs dérivés de la morphine ;
- inhibiteurs de la monoamine oxydase (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson), par exemple des médicaments contenant du tranlycypromine, phenelzine, isocarboxazide, moclobémide et linezolide.

Prévenez également votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants, qui peuvent augmenter les effets indésirables d'*OxyNorm*® ou diminuer son efficacité ; dans ce cas, votre médecin vous surveillera étroitement et adaptera éventuellement la dose d'*OxyNorm*® :

- des inhibiteurs de protéases tels que ritonavir, bocéprévir, indinavir, nelfinavir et saquinavir (médicaments utilisés dans le traitement du SIDA) ;
- des antifongiques azolés tels que kétoconazole, itraconazole, voriconazole et posaconazole (médicaments pour traiter les infections dues à des champignons) ;
- des antibiotiques macrolides tels que clarithromycine, érythromycine et télichromycine (médicaments pour traiter les infections bactériennes) ;
- cimétidine (utilisée dans le traitement des maladies gastro-intestinales) ;
- crizotinib (médicaments utilisés dans le traitement de certains cancers).

Informez également votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre un des médicaments suivants :

- Autres médicaments utilisés pour traiter la douleur tels que alfentanil, codéine, dextromoramide, dihydrocodéine, fentanyl, hydromorphone, morphine, péthidine, phénopéridine, rémifentanyl, sufentanyl, tramadol ;
- Médicament utilisés pour le traitement de la toux tels que dextrométorphane, noscapine, pholcodine, codéine et éthylmorphine ;

- Médicaments utilisés pour traiter les troubles psychiques (psychotropes) tels que les benzodiazépines et apparentés ;
- Médicaments utilisés pour traiter les troubles du sommeil (hypnotiques) tels que barbituriques ;
- Paroxétine et quinidine.

***OxyNorm*® 10 mg/ml, solution buvable avec des aliments et des boissons**

Le jus de pamplemousse contient une ou plusieurs substances qui peuvent modifier la façon dont votre corps utilise certains médicaments, dont *OxyNorm*®. Il faut éviter de boire du jus de pamplemousse pendant le traitement par *OxyNorm*®.

La prise d'alcool, de boissons ou médicaments contenant de l'alcool est fortement déconseillée au cours du traitement avec ce médicament. Cela peut avoir un effet sédatif.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Ce médicament est contre-indiqué chez la femme qui allaite.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Attention, ce médicament contient du chlorhydrate d'oxycodone qui est inscrit sur la liste des substances dopantes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez avoir la sensation d'être plus endormi que d'habitude, notamment en début de traitement, lors d'augmentation de posologie et en cas d'association avec d'autres médicaments.

Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé.

OxyNorm® 10 mg/ml, solution buvable contient :

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110, Jaune orangé S).

3. Comment prendre *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Cependant, la posologie dépendra de l'intensité de votre douleur et peut varier en fonction des personnes. Les doses doivent être adaptées à chaque personne et doivent faire l'objet d'une évaluation régulière par le médecin.

Une augmentation de l'intensité de la douleur peut nécessiter une augmentation de la dose quotidienne. Veuillez suivre les instructions de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet d'*OxyNorm*[®], solution buvable, est trop fort ou si vous ressentez toujours des douleurs, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Prenez toujours *OxyNorm*[®], solution buvable, par voie orale.

Fréquence d'administration

Ce médicament doit être pris en plusieurs prises journalières, espacées par un intervalle de 4 à 6 heures.

Suivez toujours les instructions de votre médecin.

Durée du traitement

La posologie d'*OxyNorm*[®], solution buvable, doit être ajustée fréquemment. Vous devez par conséquent consulter votre médecin régulièrement.

Tout changement ou interruption du traitement doit être effectué selon les recommandations de votre médecin.

Si vous avez pris plus d'*OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable, que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les personnes qui ont pris une dose trop importante peuvent ressentir une somnolence importante et une sensation de malaise. Des difficultés à respirer peuvent également survenir et entraîner une perte de conscience et le coma nécessitant une prise en charge d'urgence à l'hôpital. Un antidote peut être administré par injection pour arrêter les effets indésirables graves. Si vous demandez une consultation médicale, pensez à prendre cette notice et le flacon restant pour le montrer à votre médecin.

Si vous oubliez de prendre *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser celle que vous avez oublié de prendre.

Prenez la dose suivante et continuez le traitement selon les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous arrêtez de prendre *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable :

Vous ne devez pas arrêter brutalement ce traitement sauf dans le cas où votre médecin le décide. Si vous souhaitez arrêter le traitement parlez-en à votre médecin. Il vous donnera les recommandations appropriées, habituellement en diminuant les doses progressivement afin que vous n'ayez pas d'effet indésirable.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables très fréquents (peuvent concerner plus de 1 patient sur 10) sont :

- constipation, qu'il convient de traiter ;
- somnolence, nausées et vomissements, qui régressent après un certain temps ;
- sensations vertigineuses, prurit, maux de tête.

Les effets indésirables fréquents (peuvent concerner entre 1 et 10 patients sur 100) sont :

Diminution de l'appétit, anxiété, état confusionnel, dépression, insomnie, nervosité, troubles de la pensée, cauchemars, plus spécialement chez le sujet âgé, avec éventuellement hallucinations (perception anormale d'un objet qui n'existe pas dans la réalité), tremblements, augmentation de la pression intracrânienne se traduisant par des maux de tête voire des vomissements, difficultés à respirer (dyspnée), douleurs abdominales, diarrhée, sécheresse de la bouche, douleurs au niveau de l'estomac (dyspepsies), éruption cutanée, transpiration excessive (hyperhidrose), fatigue.

Les effets indésirables peu fréquents (peuvent concerner entre 1 et 10 patients sur 1000) sont :

Réaction allergique (hypersensibilité), déshydratation, agitation, changement rapide et important de l'humeur (labilité émotionnelle), euphorie, hallucinations, dépendance au médicament (voir rubrique « Mises en gardes spéciales »), troubles de la mémoire (amnésie), convulsions, tonus musculaire trop élevé (hypertonie), diminution de la sensibilité au toucher (hypoesthésie), contractions musculaires involontaires, troubles du langage, malaise (syncope), sensations de fourmillements ou d'engourdissements dans les membres (paresthésies), troubles du goût (dysgueusie), troubles de la vision, rétrécissement de la pupille (miosis), vertiges, palpitations (en cas de syndrome de sevrage), dilatation des vaisseaux sanguins (vasodilatation), respiration lente et peu profonde

(dépression respiratoire), difficultés à avaler (dysphagie), flatulences, rots, occlusion intestinale (iléus), augmentation des enzymes hépatiques, sécheresse de la peau, rétention urinaire, troubles de l'érection, diminution de la libido, frissons, syndrome de sevrage, malaise, gonflement des mains, des chevilles et des pieds (œdème périphérique), accoutumance au médicament (tolérance), soif.

Les effets indésirables rares (peuvent concerner entre 1 et 10 patients sur 10 000) sont :

Ralentissement des battements du cœur (bradycardie), pression artérielle basse (hypotension), étourdissements au passage à la position debout (hypotension orthostatique), éruption cutanée qui démange (urticaire).

Les effets indésirables suivants sont de fréquence indéterminée :

Réaction allergique sévère (réaction anaphylactique), caries dentaires, diminution de sécrétion de la bile (cholestase), douleur au niveau du foie (colique biliaire), absence de règles (aménorrhée).

En cas d'arrêt brutal de ce médicament, un syndrome de sevrage peut apparaître qui se manifeste par les symptômes suivants : bâillements, anxiété, irritabilité, insomnie, frissons, dilatation des pupilles, bouffées de chaleur, sueurs, larmolement, écoulement nasal, nausées, vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales, diarrhée, douleurs musculaires ou articulaires.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet: www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Un surdosage accidentel chez l'enfant est dangereux et pourrait être fatal.

N'utilisez pas *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable, après la date de péremption indiquée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Ce que contient *OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable

La substance active est :

Chlorhydrate d'oxycodone..... 10 mg
 Equivalent à oxycodone base..... 9 mg
 Pour 1 ml de solution buvable.

Les autres composants sont :

Saccharine sodique, benzoate de sodium (E211), acide citrique monohydraté, citrate de sodium, jaune orangé S (E110), acide chlorhydrique dilué, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Aspect d'*OxyNorm*[®] 10 mg/ml, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en flacon de 30 ml (avec seringue pour administration orale, graduée de 0,5 à 2 ml).

Titulaire
MUNDIPHARMA S.A.S.
 7-11 Quai André Citroën
 75 015 Paris
 France

Exploitant
MUNDIPHARMA S.A.S.
 7-11 Quai André Citroën
 75 015 Paris
 France

Fabricant
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LIMITED
 Dhali Industrial Area
 13 Othellos Street
 Nicosie
 2540 Chypre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2016.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

® : OXYNORM est une marque enregistrée

